

Laboratoriumgeneeskunde

Gegevens patiënt

Naam :
 Geboortedatum : (of patiëntenklever)
 Adres :

I.g.v. pre-operatieve reservatie met bloedname >3 dagen vóór ingreep:
 Geen zwangerschap/transfusie < 3 maanden (handtekening aanvragend geneesheer of patiënt):

Bloedgroep patiënt

ABO: Rhesus:
 Geef bloedgroepkaartje van patiënt mee met deze aanvraag (enkel indien kaartje uit ander labo).

Aangevraagd bloederivaat

	<u>aantal</u>		<u>aantal</u>
<input type="checkbox"/> Erythrocytenconcentraat <i>ECL toe te dienen in <=4u</i>	<input type="checkbox"/> Fibrinogeen
<input type="checkbox"/> Plasma	<input type="checkbox"/> factor ... (uitgedrukt in units)
<input type="checkbox"/> Bloedplaatjesconcentraat (uit 6 à 8 units) <i>PLC toedienen over min 20 minuten</i>	<input type="checkbox"/> COFACT
<input type="checkbox"/> single donor bloedplaatjesconcentraat	<input type="checkbox"/> ander:	

Indicatie

Voor erythrocytenconcentraat:

- chronische anemie acute anemie
- Hb < 7-8 g/dl
- Hb < 10 g/dl + risicofactoren
- pre-operatief
 - longchirurgie
 - endartectomie broek
 - aortafemorale greffe
 - andere vaatoperaties
- per/postoperatief
- andere :
- heuprothese
- knieprothese
- rug, schouder, nekchir
- polytrauma chir.
- abdominale chirurgie inva
- abdominale chirurgie LAP
- TUR prostaat
- urologie andere
- sectio caesarea
- hysterectomie vag
- hysterectomie abd
- andere

Voor bloedplaatjesconcentraat:

- massieve bloeding of blijvend bloedverlies niet onder controle
- profylaxe:
 - aanmaak defect blpl (< 10.000 blpl/mm³)
 - medisch technisch OZ (interventie) (< 60.000 blpl/mm³)
 - medisch technisch OZ (< 40.000 blpl/mm³)
 - chirurgie (< 100.000 blpl/mm³)

Voor plasma:

- geïsoleerde tekorten aan coagulatiefactor V of XI
- hemorragische accidenten, door overdosering aan antivitaminen K voor zover een onmiddellijke medische correctie noodzakelijk is, w aardoor de behandeling met vitaminen inopportuun is
- massale hemorragieën met een gecombineerd tekort aan coagulatiefactoren of trombolysen
- trombotische trombocytopenische purpura (TTP, Moschow itz)
- neonatale w isseltransfusie w egens ABO-incompatibiliteit

Bijkomende transfusiegegevens patiënt

- gekende irreguliere RBC-antistof (fen) type:
- kandidaat multiple transfusies of transplantatiekandidaat
- vroegere transfusiereactie type datum:

Te voorzien toedieningstijdstip:

datum:/..../.... Uur:

ONGEKRUIST URGENT UITLEVEREN: toe te dienen onder verantwoordelijkheid van behandelend arts:

- type 1:** 2x bloedgroepbepaling met recente IC gekend (< 1 maand)
- type 2:** ongekende bloedgroep of 1 bloedgroepbepaling zonder IC
- type 3:** polytrauma patiënt SUPERURGENT

Verpleegkundige die de bloedafname verrichtte (naam en handtekening):

INFORMED CONSENT

Patiënt of wettelijke vertegenwoordiger werd door mij ingelicht over v oor en nadelen v an een transfusie v an bloed of bloedderivaten en stemt in met toediening v an bedoelde derivaten

Datum :

Aanvragende geneesheer (stempel en handtekening):