



**ALGEMEEN
ZIEKENHUIS
ST.-DIMPNA**

Laboratoriumgeneeskunde

Tel Geel 014 577061
Fax Geel 014577450
Dr. Bogaerts A.
Dr. de Mûelenaere G.
Apr. Biol. Van Thienen T.

Patiëntgegevens

Sticker of naam, voornaam:

Adres:

Geboortedatum:

Aanvraagformulier Moleculaire Biologische Onderzoeken

Labo sticker

Stempel en handtekening aanvragend geneesheer

Datum:

Hepatitis B virus DNA kwantitatief (art. 24 bis)

- Voor de start van de behandeling voor chronische HBsAg positieve hepatitis B patiënten. (In deze indicatie kan de bepaling slechts éénmaal worden aangerekend. - Behalve tijdens het eerste jaar maximum 3 maal.)
- In de opvolging van behandeling voor chronische HBsAg positieve hepatitis B patiënten. (Maximaal tweemaal per jaar.)
- Bij plotse heropflakking van chronische HBsAg positieve hepatitis B patiënten, gebaseerd op abnormale levertesten. (Maximaal tweemaal per jaar.)
- € Rekening patiënt

*Serum of
EDTA-plasma*

Hepatitis C virus RNA kwalitatief (art. 24 bis)

- Vermoeden van HCV infectie bij een kind van een bewezen HCV-positieve moeder. (In deze indicatie kan de bepaling slechts éénmaal worden aangerekend.)
- Aantonen van HCV bij een bewezen HCV-antistof positieve patiënt. (In deze indicatie kan de bepaling slechts éénmaal worden aangerekend.)
- Aantonen van HCV-infectie in immuungecompromitteerde patiënten met symptomen van hepatitis (inclusief dialyse patiënten), ook bij negatief resultaat voor detectie van anti-HCV antistoffen. (In deze indicatie kan de bepaling éénmaal worden aangerekend in de 3 maanden volgend op de symptomen.)
- Bij een prikaccident met een HCV positieve persoon en op voorwaarde dat het slachtoffer functionele stoornissen ontwikkelt duidend op een hepatitis. (In deze indicatie kan de bepaling éénmaal worden aangerekend in de 3 maanden volgend op de vaststelling van de feiten.)
- € Rekening patiënt

*Serum of
EDTA-plasma*

Hepatitis C virus RNA kwantitatief (art. 24 bis)

- De verstrekking kan per periode van medicamenteuze behandeling slechts 4 maal aan het ZIV aangerekend worden, voor zo ver verantwoord in de context van het opvolgen van deze behandeling.
- € Rekening patiënt

*Serum of
EDTA-plasma*

Hepatitis C virus RNA genotypering (art. 24 bis)

- Deze verstrekking kan slechts worden uitgevoerd éénmaal per patiënt namelijk bij het opstarten van een behandeling.
- € Rekening patiënt

*Serum of
EDTA-plasma*

Staaltype

Enterovirussen RNA (art. 24 bis)		<u>Staaltype</u>
<input type="checkbox"/> Symptomen van virale meningitis of meningo-encephalitis. (Maximaal 1 bepaling per episode.)		<u>Lumbaalvocht</u>
<input type="checkbox"/> Acute pericarditis en/of myocarditis. (Maximaal 2 afnames per episode.)		<u>Pericardvocht</u>
<input type="checkbox"/> Prenatale diagnose op amniosvocht van congenitale infectie, enkel in gevallen van duidelijke echografische diagnose van foetale groeiachterstand, polyhydramnios, oligohydramnios, pleura- of pericarduitstorting, abdominale hyperechogeniciteit, abdominale calcificaties of van mors in utero. (Maximaal 1 bepaling.)		<u>Amniosvocht</u>
<input type="checkbox"/> € Rekening patiënt		<u>Staal:</u>
Herpes Simplex virus DNA (HSV1 + HSV2) (art. 24 bis)		<u>Lumbaalvocht</u>
<input type="checkbox"/> Patiënten met neurologische symptomen van encephalitis, meningoencephalitis, meningitis, myelitis. (Maximum 2 per episode.)		<u>Oogwisser</u>
<input type="checkbox"/> Patiënten met oftalmologische aandoeningen : keratitis, uveïtis, acute retinitis. (Maximum 2 bepalingen per episode.)		<u>Wisser:.....</u>
<input type="checkbox"/> Herpes neonatorum. (Maximum 1 bepaling per episode.)		<u>Respir:.....</u>
<input type="checkbox"/> Immuungecompromitteerde patiënten met oesophagale, intestinale of respiratoire tractus laesies. (Maximum 2 bepalingen per episode.)		<u>Staal:</u>
<input type="checkbox"/> € Rekening patiënt		
Varicella Zoster virus DNA (art. 24 bis)		<u>Lumbaalvocht</u>
<input type="checkbox"/> Patiënten met neurologische symptomen van encephalitis, meningoencephalitis, meningitis, myelitis. (Maximum 2 per episode)		<u>Oogwisser</u>
<input type="checkbox"/> Patiënten met oftalmologische aandoeningen : keratitis, uveïtis, acute retinitis. (Maximum 2 bepalingen per episode.)		<u>Staal:</u>
<input type="checkbox"/> € Rekening patiënt		
Toxoplasma gondii DNA (art. 24 bis)		<u>Lumbaalvocht</u>
<input type="checkbox"/> Diagnose van cerebrale toxoplasmose bij immuungecompromitteerde patiënten met een positieve serologie voor IgG en met klinische en radiografische tekenen wijzend op een cerebrale toxoplasmose. (Maximum 1 bepaling per episode.)		<u>Amniosvocht</u>
<input type="checkbox"/> Prenatale diagnose van congenitale toxoplasmose op amniosvocht. De volgende groepen van patiënten komen in aanmerking : a) patiënten met seroconversie voor toxoplasma gondii tijdens de zwangerschap (negatieve IgG bij eerste raadpleging, positief worden van IgG bij een daaropvolgende bloedafname). De seroconversie moet steeds bevestigd worden op een tweede serummonster. b) Patiënten met een serologisch profiel bij het begin van de zwangerschap waarvan niet met zekerheid kan worden uitgemaakt of de infectie vóór of na de conceptie optrad. Hiervoor moeten minstens 2 serummonsters worden onderzocht met een tijdsinterval van minstens 3 weken. (Maximum 1 bepaling per episode.)		<u>Staal:</u>
<input type="checkbox"/> Oppuntstelling van een mors in utero, hydrocefalie, intracerebrale calcificatie. (Maximum 1 bepaling per episode.)		<u>Oogwisser</u>
<input type="checkbox"/> Diagnostiek van oculaire toxoplasmose. Patiënten met positieve serologie voor IgG en indien de oogfundus een toxoplasma chorioretinitis suggereert. (Maximum 1 bepaling per episode.)		<u>Staal:</u>
<input type="checkbox"/> € Rekening patiënt		
Cytomegalovirus DNA semikwantitatief (art. 24)		<u>EDTA-bloed</u>
<input type="checkbox"/> Transplantpatiënt, HIV-infectie of behandeling met immunosuppressiva		<u>Staal:</u>
<input type="checkbox"/> € Rekening patiënt		
Chlamydia trachomatis DNA (art. 24)		<u>Urine of urogenital wisser</u>
<input type="checkbox"/> Klinische context van een risicogroep, tot en met de leeftijd van 20 jaar, of bij duidelijke klinische tekens van een Chlamydia-infectie. (Deze test mag maximum twee maal per kalenderjaar aangerekend worden.)		<u>Staal:</u>
<input type="checkbox"/> € Rekening patiënt		
Neisseria gonorrhoeae DNA (art. 24)		<u>Urine of urogenital wisser</u>
<input type="checkbox"/> Deze test mag maximum één maal per inschrijving		