



Sint-Dimpna
Ziekenhuis Geel

PATIËNTENBROCHURE
Gebruik van inhalatiesysteem
Easyhaler

Omwille van een (long)aandoening bent u genoodzaakt inhalatiemedicijnen in te nemen. Deze brochure beschrijft het correct gebruik van uw inhalatiesysteem of -toestel.

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen, aarzel dan zeker niet ze te stellen. Uw behandelende arts, verpleegkundige, ergotherapeut, kinesist of apotheker geeft u graag meer uitleg. Info over dosis of bijwerkingen vindt u terug in de bijsluiter van het product.

De instructies voor het gebruik van de inhalatiemedicatie zijn als filmpje beschikbaar op www.ziekenhuisgeel.be.



Easyhaler

Techniek

1. Ga rechtop zitten.
2. Neem de Easyhaler uit de beschermdoos.
3. Hou de Easyhaler rechtop stevig vast en schud hem enkele malen krachtig.
4. Verwijder de beschermdop van het mondstuk.
5. Blijf de Easyhaler rechtop houden. Druk de drukknop bovenaan volledig in: u hoort een 'klik' en laat dan de drukknop terug los. De Easyhaler is geladen. De medicatie staat nu klaar voor gebruik.
6. Blijf de Easyhaler rechtop houden.
7. Adem rustig en bijna volledig uit (nooit uitademen in de inhalator).
8. Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de lippen. Zorg dat uw hand het luchtroostertje bovenaan niet afsluit.
9. Buig het hoofd licht achterover.
10. Adem snel en diep in, zodat de medicatie vrijkomt. Blijf daarna volledig verder inademen.
11. Hou de adem 5 à 10 seconden in en neem ondertussen de Easyhaler uit de mond.
12. Adem rustig uit langs de mond (nooit uitademen in de inhalator).
13. Als u meerdere dosissen moet nemen: herhaal stap 3 tot en met 11.
14. Plaats de beschermdop terug op het mondstuk en plaats de inhalator in de beschermdoos.
15. Spoel de mond met water (niet inslikken).



Aanbevelingen

- Bewaar de Easyhaler op een droge en koele plaats.
- Adem nooit uit in de Easyhaler.
- De Easyhaler is leeg als de dosisteller op nul staat. Controleer dit tijdig.