



Botox infiltraties bij spasticiteit na CVA

Hoe een afspraak maken?

Secretariaat Fysische Geneeskunde en Revalidatie 014 57 70 35

Algemene openingsuren: elke dag van 8u30 tot 12u en van 12u30 tot 17u.



Spasticiteit komt vaak voor bij mensen die een CVA of beroerte hebben gehad.

Spasticiteit is een toegenomen spierspanning in arm of been aan de kant van de verlamming. Dit komt omdat de zenuwen die uw spieren controleren zijn aangetast door de beroerte. Spasticiteit kan pijnlijk zijn. Na verloop van tijd kunnen de spieren ook korter worden dan normaal. Vaak wordt het hierdoor moeilijker om u aan te kleden en te wassen.

Spasticiteit wordt behandeld met medicatie, spalken en revalidatie. Indien dit niet volstaat kan gekeken worden of BOTOX infiltraties bij u nuttig kunnen zijn.

Wat is BOTOX?

Botuline toxine of BOTOX blokkeert de prikkeloverdracht van de zenuwen naar de spieren. Hierdoor vermindert de overactiviteit van de spieren waardoor deze zich ontspannen.

Wie komt in aanmerking?

De revalidatiearts zal u op raadpleging zien en nagaan of u voldoet aan de voorwaarden voor een behandeling met BOTOX.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

- De eerste behandeling gebeurt tussen de 3 maand en het jaar na uw cva of beroerte
- Er is een spasticiteit van pols en vingers
- Er zijn nog geen spierverkortingen
- U volgt revalidatie in het ziekenhuis
- Er is door het revalidatieteam een specifieke doelstelling vooropgesteld die we willen bereiken met de BOTOX infiltraties

Hoe verloopt een behandeling?

De arts bepaalt welke spieren bij u moeten behandeld worden en met welke dosis BOTOX.

Tijdens de behandeling wordt met een speciale naald de BOTOX ingespoten in de spieren. Door kleine elektrische schokjes op de naald te zetten zal de spier zich opspannen en zal uw arm wat bewegen. Dit is niet pijnlijk. Hiermee kunnen we zien of de naald perfect in de juiste spier zit die we willen behandelen.

De eerste weken na de behandeling

Het effect van de behandeling zal u na enkele weken voelen en blijft gemiddeld 4 maanden duren. Tijdens deze periode wordt zo nodig uw therapie of spalk aangepast en wordt geëvalueerd of verdere behandeling bij u zinvol is.



Wat zijn de mogelijke neveneffecten?

Over het algemeen treden bijwerkingen in de eerste dagen na toediening op en zijn deze van voorbijgaande aard. Bij elke injectie is het te verwachten dat zich lokaal pijn of blauwe plekvorming kan voordoen. Zelden is er ook sprake van wat malaise of een griepig gevoel.

Hoeveel kost een behandeling?

Voorlopig is BOTOX enkel terugbetaald voor de behandeling van spasticiteit van de arm na een CVA. De BOTOX wordt gedeeltelijk terugbetaald als u aan de voorwaarden voldoet, maar u moet zelf nog een deel van de medicatie betalen. Ook voor de speciale naald wordt een opleg gevraagd. Uw arts zal u hier op voorhand over inlichten.