



**Sint-Dimpna**  
Ziekenhuis Geel

# **PATIËNTENBROCHURE**

**Gazyvaro®**  
**(obinutuzumab)**

TOON DEZE FOLDER AAN UW HUISARTS, HUISAPOTHEKER  
EN THUISVERPLEEGKUNDIGE

# Behandelschema

Deze kuur bestaat uit een behandeling met 1 geneesmiddel, namelijk Gazyvaro® (obinutuzumab).

Dit is een doelgerichte therapie. Gazyvaro® (obinutuzumab) hecht zich vast aan een bepaald eiwit op de wand van de kankercellen, stimuleert het immuunsysteem en zet zo processen in gang die de cellen zullen doden.

Tijdens de toediening van Gazyvaro® (obinutuzumab) is er continue monitoring.

	Dag 1	Dag 2	Dag 8 en 15	Cyclus 2 – 6: dag 1
Gazyvaro®	100 mg in infuus over 4 uur	900 mg in infuus over 6 uur	1000 mg in infuus over 6 uur	1000 mg in infuus over 6 uur

## Bijkomende medicatie op dag 1 (dag van de chemotherapie)

Vooraleer de chemotherapie wordt gestart, zullen andere geneesmiddelen toegediend worden als ondersteuning van de behandeling:

- Zantac® 50 mg via infuus  
Dit product dient ter bescherming van de maag.
- Paracetamol® via infuus  
Dit product werkt preventief tegen eventuele pijn.
- Solu-medrol® 80 mg via infuus  
Dit product gaat de misselijkheid tegen en beschermt eveneens tegen allergische reacties tijdens de toediening.
- Cetirizine® 10 mg 1 comprimé  
Voor de start van de toediening van Gazyvaro® wordt dit geneesmiddel gegeven om een mogelijke allergische reactie te voorkomen.

## Bijwerkingen

- (Allergische) reactie op het infuus
- Oorts
- Diarree, obstipatie
- Griep
- Gewrichtspijn
- Hoesten
- Verminderde aanmaak rode bloedcellen (vermoeidheid), witte bloedcellen (infecties) en bloedplaatjes (bloedingen)
- Infecties bovenste luchtwegen, sinusitis
- Ontsteking
- Hoge bloeddruk

Indien u meer informatie wenst rond de mogelijke nevenwerkingen van uw behandeling en bijhorende tips, raadpleeg dan de algemene brochure **'Chemotherapie op het oncologisch daghospitaal'**.

## Thuismedicatie

U moet thuis geen verdere medicatie innemen ter ondersteuning van de behandeling.

## **Bij volgende klachten of tekens:**

### **Raadpleeg uw (huis)arts**

- Koude rillingen.
- Bloed in urine of stoelgang.
- Spontaan ontstaan van grote of veel blauwe plekken.
- Onvoldoende effect van de geneesmiddelen tegen misselijkheid.
- Pijn in de mond, moeilijk en/of pijnlijk slikken.
- Constipatie of verstopping langer dan 3 dagen.
- Pijn bij plassen, vaak plassen, troebele urine.
- Plotse huiduitslag.

### **Raadpleeg spoedgevallen**

- Koorts boven 38,5 graden.
- Overgevoeligheidsreacties.
- Wondjes en neusbloedingen, die langer dan 15 minuten bloeden.
- Puntbloedingen op de huid.
- Een gezwollen hand of arm aan de kant waar de poortkatheter zich bevindt.
- Overvloedig braken langer dan 24uur.
- Diarree langer dan 48 uur.
- Hartproblemen bestaande uit kortademigheid, hartkloppingen, vochtophoping in de benen.

**Meld bij uw volgende bezoek alle ongemakken die u ondervindt van uw therapie.**

**Bij enige twijfel mag u steeds het oncologisch daghospitaal of het secretariaat van uw arts contacteren.**

# Nuttige telefoonnummers

Sint-Dimpna ziekenhuis Geel  
014/57.77.77

Oncologisch dagziekenhuis  
014/57.71.74

Verblijfsafdeling oncologie  
014/57.73.70

Spoedgevallen  
014/57.70.00

Behandelende artsen

- Dr. De Samblanx
- Dr. de Vooght
- Dr. Beckers

Website: [www.ziekenhuisgeel.be](http://www.ziekenhuisgeel.be)

Versie: 16/04/2018

Alhoewel de ziekenhuisapothekers van het AZ Sint-Dimpna ziekenhuis te Geel de medische informatie omtrent dit product kritisch hebben doorgenomen, kunnen zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de folder. Het gebruik van de folder is op eigen risico en verantwoordelijkheid. Deze folder vervangt de bijsluiter niet.