



Sint-Dimpna
Ziekenhuis Geel

PATIËNTENBROCHURE

**Kyprolis®
(carfilzomib)**

TOON DEZE FOLDER AAN UW HUISARTS, HUISAPOTHEKER
EN THUISVERPLEEGKUNDIGE

Behandelschema

Deze behandelign bestaat uit één cytostaticum, namelijk Kyprolis® (carfilzomib). Kyprolis® (carfilzomib) is een geneesmiddel dat de afbraak van eiwitten in de cel blokkeert. Zo ontstaat er een overaanbod aan eiwitten in de cel. Dit onevenwicht kan de cel doden.

Kyprolis® (carfilzomib) wordt vaak gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen.

	Dag 1 - 2	Dag 8 - 9	Dag 15 - 16	Dag 22 - 23	Wijze van toediening
Kyprolis® (carfilzomib)	X	X	X	RUST	Infuus over 30 min
Dexamethasone® 40, 20 of 10 mg	X	X	X	X	Peroraal

Bijkomende medicatie op dag 1 (dag van de chemotherapie)

Vooraleer de chemotherapie wordt gestart, zullen andere geneesmiddelen toegediend worden als ondersteuning van de behandeling:

- Litican® 50 mg IV (1 ampul)
Dit geneesmiddel gaan misselijkheid en braken tegen

Bijwerkingen

- (Allergische) reacties op het infuus
- Verminderde aanmaak rode bloedcellen (vermoeidheid), witte bloedcellen (infecties) en bloedplaatjes (bloedingen)
- Verhoogde bloeddruk
- Bijkpijn
- Diarree, obstipatie
- Gewichtsafname
- Grieperig gevoel, spierpijn
- Misselijkheid en braken
- Smaakveranderingen
- Slapeloosheid
- Vasthouden van vocht (oedeem)
- Verhoogde bloedsuikers
- Nevenwerkingen van Dexamethasone®: maaglast, slaapstoornissen, verhoogde eetlust

Indien u meer informatie wenst rond de mogelijke nevenwerkingen van uw behandeling en bijhorende tips, raadpleeg dan de algemene brochure **‘Chemotherapie op het oncologisch daghospitaal’**.

Thuismedicatie

Wanneer u naar huis gaat, krijgt u nog extra medicatie mee naar huis ter ondersteuning van de behandeling:

- Lasix 40 mg peroraal (1/2^e tablet)
Dit geneesmiddel gaat het vasthouden van vocht tegen.
- Zovirax® 800 mg tablet
Dit geneesmiddel moet 1 x per dag genomen worden ter preventie van schimmelinfecties.

Indien nodig:

- Litican® 50 mg comprimés of Primperan® 10 mg comprimés max 4 x per dag
Deze geneesmiddelen werken tegen misselijkheid. We raden aan het geneesmiddel 30 minuten voor de maaltijd in te nemen.

Bij volgende klachten of tekens:

Raadpleeg uw (huis)arts

- Koude rillingen.
- Bloed in urine of stoelgang.
- Spontaan ontstaan van grote of veel blauwe plekken.
- Onvoldoende effect van de geneesmiddelen tegen misselijkheid.
- Pijn in de mond, moeilijk en/of pijnlijk slikken.
- Constipatie of verstopping langer dan 3 dagen.
- Pijn bij plassen, vaak plassen, troebele urine.
- Plotse huiduitslag.

Raadpleeg spoedgevallen

- Koorts boven 38,5 graden.
- Overgevoeligheidsreacties.
- Wondjes en neusbloedingen, die langer dan 15 minuten bloeden.
- Puntbloedingen op de huid.
- Een gezwollen hand of arm aan de kant waar de poortkatheter zich bevindt.
- Overvloedig braken langer dan 24uur.
- Diarree langer dan 48 uur.
- Hartproblemen bestaande uit kortademigheid, hartkloppingen, vochtophoping in de benen.

Meld bij uw volgende bezoek alle ongemakken die u ondervindt van uw therapie.

Bij enige twijfel mag u steeds het oncologisch daghospitaal of het secretariaat van uw arts contacteren.

Nuttige telefoonnummers

Sint-Dimpna ziekenhuis Geel
014/57.77.77

Oncologisch dagziekenhuis
014/57.71.74

Verblijfsafdeling oncologie
014/57.73.70

Spoedgevallen
014/57.70.00

Behandelende artsen

- Dr. De Samblanx
- Dr. de Vooght
- Dr. Beckers

Website: www.ziekenhuisgeel.be

Versie: 16/04/2018

Alhoewel de ziekenhuisapothekers van het AZ Sint-Dimpna ziekenhuis te Geel de medische informatie omtrent dit product kritisch hebben doorgenomen, kunnen zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de folder. Het gebruik van de folder is op eigen risico en verantwoordelijkheid. Deze folder vervangt de bijsluiter niet.