



Sint-Dimpna
Ziekenhuis Geel

PATIËNTENBROCHURE

Mabthera® + CHOP

TOON DEZE FOLDER AAN UW HUISARTS, HUISAPOTHEKER
EN THUISVERPLEEGKUNDIGE

Behandelschema

Deze kuur bestaat uit 1 monoklonaal antilichaam (Mabthera®), 3 cytostatica en prednisolone per oraal. De cytostatica Endoxan® (cyclofosfamide), Doxorubicine® en Vincristine® worden samen met prednisolone benoemd als 'CHOP'. Onderstaand schema is 1 cyclus uit uw behandeling.

| | Dag 1 | DAG 2t/m 21 | Wijze van toediening |
|---------------------------------|-------|-------------|--------------------------|
| Mabthera® (rituximab) | X | RUST | Wordt traag toegediend |
| Endoxan® (cyclofosfamide) | X | RUST | 30 min |
| Doxorubicine® (doxorubicine) | X | RUST | 10 min |
| Vincristine® (vincristine) | X | RUST | 15 min |
| Prednisolone | - | 2 t/m dag 6 | 5 capsules mee naar huis |

Bijkomende medicatie op dag 1

Vooraleer de chemotherapie wordt gestart, zullen andere geneesmiddelen toegediend worden als ondersteuning van de behandeling.

Voor de start van Mabthera® (rituximab):

- Cetirizine® 10 mg tablet
Dit geneesmiddel wordt gegeven om een mogelijke allergische reactie te voorkomen.
- Ranitidine 50mg (Zantac®) via infuus
Dit product dient ter bescherming van de maag.
- Paracetamol (Paracetamol®) via infuus
Dit product werkt preventief tegen pijn.
- Solu-medrol® 80 mg via infuus
Dit product gaat eveneens de misselijkheid tegen en beschermt eveneens tegen allergische reacties tijdens de toediening.

Voor de start van CHOP:

- Aloxi® en Litan® IV
Deze geneesmiddelen werken preventief tegen misselijkheid.
- Neulasta®
Deze spuit werkt preventief tegen een daling van het aantal witte bloedcellen.
- Aranesp®
Deze spuit werkt preventief tegen een daling van het aantal rode bloedcellen.

Bijwerkingen

- Verminderde aanmaak van rode bloedcellen (vermoeidheid), witte bloedcellen (infecties) en bloedplaatjes (bloedingen)
- Bloeddrukverlaging
- Spierpijn, botpijn, griepig gevoel
- Hoofdpijn
- Irritatie van de huid
- Koorts
- Misselijkheid en braken
- Allergie
- Haaruitval

Indien u meer informatie wenst rond de mogelijke nevenwerkingen van uw behandeling en bijhorende tips, raadpleeg dan de algemene brochure '**Chemotherapie op het oncologisch daghospitaal**'.

Thuismedicatie

Thuis krijgt u nog extra medicatie ter ondersteuning van de behandeling:

- Prednisolone® capsule
Dit geneesmiddel is nog een onderdeel van het CHOP-schema en werd speciaal voor u bereid. Te beginnen vanaf de dag na uw chemotoediening.

Bij volgende klachten of tekens:

Raadpleeg uw (huis)arts

- Koude rillingen
- Bloed in urine of stoelgang
- Spontaan ontstaan van grote of veel blauwe plekken
- Overgevoelighedsreacties
- Onvoldoende effect van de geneesmiddelen tegen misselijkheid
- Diarree langer dan 48 uur
- Pijn in de mond, moeilijk en/of pijnlijk slikken
- Constipatie of verstopping langer dan 3 dagen
- Pijn bij plassen
- Plotse huiduitslag

Raadpleeg spoedgevallen

- Koorts boven 38,5 °C
- Wondjes en neusbloedingen, die langer dan 15 minuten bloeden
- Puntbloedingen op de huid
- Een gezwollen hand of arm aan de kant waar de poortkatheter zich bevindt
- Overvloedig braken langer dan 24 uur

Meld bij uw volgende bezoek alle ongemakken die u ondervindt van uw therapie.

Bij enige twijfel mag u steeds het oncologisch daghospitaal of het secretariaat van uw arts contacteren.

Nuttige telefoonnummers

Sint-Dimpna ziekenhuis Geel
014/57.77.77

Oncologisch dagziekenhuis
014/57.71.74

Verblijfsafdeling oncologie
014/57.73.70

Spoedgevallen
014/57.70.00

Behandelende artsen
Dr. De Samblanx
Dr. De Vooght
Dr. Beckers

Website: www.ziekenhuisgeel.be

Versie: 06/04/2018

Alhoewel de ziekenhuisapothekers van het AZ Sint-Dimpna ziekenhuis te Geel de medische informatie omtrent dit product kritisch hebben doorgenomen, kunnen zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de folder. Het gebruik van de folder is op eigen risico en verantwoordelijkheid. Deze folder vervangt de bijsluiter niet.