



Sint-Dimpna
Ziekenhuis Geel

PATIËNTENBROCHURE

**Mabthera®
(rituximab)**

TOON DEZE FOLDER AAN UW HUISARTS, HUISAPOTHEKER
EN THUISVERPLEEGKUNDIGE

Behandelschema

Deze behandeling bestaat uit één geneesmiddel namelijk Mabthera® (rituximab).

Dit is een geneesmiddel dat zich vasthecht aan bepaalde eiwitten op de wand van de tumorcellen. Hierdoor kan de groei van deze cellen gestopt worden.

Tijdens de toediening van Mabthera® (rituximab) is er continue monitoring.

	Dag 1	Wijze van toediening
Mabthera® (rituximab)	X	1 ^e toediening: over 5 uur 2 ^e toediening en verder: over 4 uur

Bijkomende medicatie op dag 1 (dag van de chemotherapie)

Vooraleer de chemotherapie wordt gestart, zullen andere geneesmiddelen toegediend worden als ondersteuning van de behandeling:

- Zantac® 50 mg via infuus
Dit product dient ter bescherming van de maag.
- Paracetamol® via infuus
Dit product werkt preventief tegen pijn.
- Solu-medrol® 80 mg via infuus
Dit product gaan eveneens de misselijkheid tegen en beschermt tegen allergische reacties tijdens de toediening.
- Cetrizine® 10 mg comprimé
Dit geneesmiddel wordt gegeven om een mogelijke allergische reactie te voorkomen.

Bijwerkingen

- Allergische reactie
- Rillingen
- Spierstijfheid
- Opyliegers
- Misselijkheid
- Vermoeidheid
- Hoofdpijn
- Keelirritatie
- Rhinitis
- Braken
- Lage of hoge bloeddruk

Indien u meer informatie wenst rond de mogelijke nevenwerkingen van uw behandeling en bijhorende tips, raadpleeg dan de algemene brochure **'Chemotherapie op het oncologisch daghospitaal'**.

Thuismedicatie

U moet thuis geen bijkomende medicatie innemen ter ondersteuning van de behandeling.

Bij volgende klachten of tekens:

Raadpleeg uw (huis)arts

- Koude rillingen.
- Bloed in urine of stoelgang.
- Spontaan ontstaan van grote of veel blauwe plekken.
- Onvoldoende effect van de geneesmiddelen tegen misselijkheid.
- Pijn in de mond, moeilijk en/of pijnlijk slikken.
- Constipatie of verstopping langer dan 3 dagen.
- Pijn bij plassen, vaak plassen, troebele urine.
- Plotse huiduitslag.

Raadpleeg spoedgevallen

- Koorts boven 38,5 graden.
- Overgevoeligheidsreacties.
- Wondjes en neusbloedingen, die langer dan 15 minuten bloeden.
- Puntbloedingen op de huid.
- Een gezwollen hand of arm aan de kant waar de poortkatheter zich bevindt.
- Overvloedig braken langer dan 24uur.
- Diarree langer dan 48 uur.
- Hartproblemen bestaande uit kortademigheid, hartkloppingen, vochtophoping in de benen.

Meld bij uw volgende bezoek alle ongemakken die u ondervindt van uw therapie.

Bij enige twijfel mag u steeds het oncologisch daghospitaal of het secretariaat van uw arts contacteren.

Nuttige telefoonnummers

Sint-Dimpna ziekenhuis Geel
014/57.77.77

Oncologisch dagziekenhuis
014/57.71.74

Verblijfsafdeling oncologie
014/57.73.70

Spoedgevallen
014/57.70.00

Behandelende artsen

- Dr. De Samblanx
- Dr. de Vooght
- Dr. Beckers

Website: www.ziekenhuisgeel.be

Versie: 16/04/2018

Alhoewel de ziekenhuisapothekers van het AZ Sint-Dimpna ziekenhuis te Geel de medische informatie omtrent dit product kritisch hebben doorgenomen, kunnen zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de folder. Het gebruik van de folder is op eigen risico en verantwoordelijkheid. Deze folder vervangt de bijsluiter niet.