Sint-Dimpna
Ziekenhuis Geel

PATIËNTENBROCHURE

Mabthera® + Fludarabine® + Endoxan®
(rituximab + fludarabine + cyclofosfamide)

TOON DEZE FOLDER AAN UW HUISARTS, HUISAPOTHEKER EN THUISVERPLEEGKUNDIGE

Behandelschema

Deze kuur bestaat uit de behandeling met 3 geneesmiddelen, waaronder het specifiek werkende monoklonaal antilichaam rituximab of Mabthera® en 2 chmotherapeutica.

	Elke 4 weken	Wijze van toediening
Mabthera® (rituximab)	Dag 1	Wordt traag toegediend
Fludarabine® (fludarabine)	Dag 1 – 3	Infuus over 1 uur
Endoxan® (cyclofosfamide)	Dag 1 – 3	Infuus over 1 uur

Tijdens de toediening van Mabthera® (rituximab) is er continue monitoring.

Bijkomende medicatie op dag 1 (dag van de chemotherapie)

Vooraleer de chemotherapie wordt gestart, zullen andere geneesmiddelen toegediend worden als ondersteuning van de behandeling:

- Zantac® 50 mg via infuus (dag 1)
  Dit product dient ter bescherming van de maag.
- Paracetamol® via infuus (dag 1)
  Dit product werkt preventief tegen pijn.
- Solu-medrol® 80 mg via infuus (dag 1)
  Dit product gaat de misselijkheid tegen.
- Cetirizine® 10 mg 1 comprimé (dag 1)
  Dit geneesmiddel voorkomt mogelijke allergische reactie op de toediening.

- Aloxi® via infuus (Dag 1, 2 en 3)
  Dit geneesmiddel werkt tegen misselijkheid en braken.

Indien u moet braken, kan er nog een extra ampul Litican® worden toegediend.

Bijwerkingen

- Verminderde aanmaak van rode bloedcellen (vermoeidheid), witte bloedcellen (infecties) en bloedplaatjes (bloedingen)
- Verhoogde of verlaagde bloeddruk
- Diarree
- Spierpijn, grieperig gevoel
- Hoofdpijn
- Jeuk, uitslag
- Koorts op dag van toediening
- Krachtsvermindering
- Misselijkheid en braken
- Oedeem
- Vermoeidheid
- Tintelingen in handen en voeten

Indien u meer informatie wenst rond de mogelijke nevenwerkingen van uw behandeling en bijhorende tips, raadpleeg dan de algemene brochure **'Chemotherapie op het oncologisch daghospitaal'.**

Thuismedicatie

Wanneer u naar huis gaat, krijgt u nog extra medicatie mee naar huis ter ondersteuning van de behandeling:

- Eusaprim forte® 2 x 2 co per week of 4 x 1 co per week
  Dit is een antibioticum waarvan 2 x 2 comprimés per week genomen moeten worden, en dit tot zes maanden na de chemotherapie.
- Zyloric® 100 mg
- Zovirax® 800 mg 1 x per dag
  Dit geneesmiddel moet 1 x per dag genomen worden ter preventie van infecties.
- Litican® 50 mg comprimés of Primperan® 10 mg comprimés max 4 x per dag
  Deze geneesmiddelen werken tegen misselijkheid. We raden aan het geneesmiddel 30 minuten voor de maaltijd in te nemen.

Bij volgende klachten of tekens:

Raadpleeg uw (huis)arts

- Koude rillingen.
- Bloed in urine of stoelgang.
- Spontaan ontstaan van grote of veel blauwe plekken.
- Onvoldoende effect van de geneesmiddelen tegen misselijkheid.
- Pijn in de mond, moeilijk en/of pijnlijk slikken.
- Constipatie of verstopping langer dan 3 dagen.
- Pijn bij plassen, vaak plassen, troebele urine.
- Plotse huiduitslag.

Raadpleeg spoedgevallen

- Koorts boven 38,5 graden.
- Overgevoeligheidsreacties.
- Wondjes en neusbloedingen, die langer dan 15 minuten bloeden.
- Puntbloedingen op de huid.
- Een gezwollen hand of arm aan de kant waar de poortkatheter zich bevindt.
- Overvloedig braken langer dan 24uur.
- Diarree langer dan 48 uur.
- Hartproblemen bestaande uit kortademigheid, hartkloppingen, vochtophoping in de benen.

Meld bij uw volgende bezoek alle ongemakken die u ondervindt van uw therapie.
Bij enige twijfel mag u steeds het oncologisch daghospitaal of het secretariaat van uw arts contacteren.

Nuttige telefoonnummers

Sint-Dimpna ziekenhuis Geel
014/57.77.77

Oncologisch dagziekenhuis
014/57.71.74

Verblijfsafdeling oncologie
014/57.73.70

Spoedgevallen
014/57.70.00

Behandelende artsen

- Dr. De Samblanx
- Dr. de Vooght
- Dr. Beckers

Website: www.ziekenhuisgeel.be

Versie: 16/04/2018

Alhoewel de ziekenhuisapothekers van het AZ Sint-Dimpna ziekenhuis te Geel de medische informatie omtrent dit product kritisch hebben doorgenomen, kunnen zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de folder. Het gebruik van de folder is op eigen risico en verantwoordelijkheid. Deze folder vervangt de bijsluiter niet.