



Sint-Dimpna
Ziekenhuis Geel

PATIËNTENBROCHURE

Verkleining van de neusschelpen

NEUSSCHELPVERKLEINING (conchotomie of conchacaustiek)

Algemeen

De neusschelpen (conchae) bevinden zich in het linker en rechter deel van de neus. Ze zijn bekleed met een laag slijmvlies en verwarmen en bevochtigen de ingeademde lucht. Soms echter is de onderste neusschelp zo groot of het slijmvlies zo gezwollen dat de ademhaling door de neus wordt bemoeilijkt, of zelfs onmogelijk is.

Doel

Het doel van de operatie is het verkleinen van de onderste neusschelp, zodat de ademhaling door de neus verbetert.

Opname

Over het algemeen vindt de operatie plaats in daghospitaal of met één overnachting. De dag na de operatie kan u na de middag naar huis.

De operatie

De operatie duurt ongeveer 20 minuten en wordt meestal onder algemene verdoving (narcose) uitgevoerd. De NKO-arts verwijdert, in de lengterichting, een strook van één of beide neusschelpen. Ter voorkoming van nabloeden wordt een tampon in beide neusgaten geplaatst.

Na de operatie

De operatie veroorzaakt maar weinig pijn. Bij pijnklachten adviseren wij Paracetamol, omdat andere pijnstillers het bloed vaak iets verdunnen waardoor de kans op nabloeding toeneemt. Eén of twee dagen na de operatie worden de neustampons verwijderd. Gedurende de genezing van het slijmvlies (4-6 weken) treedt er korstvorming en overvloedige slijmvorming op.

Complicaties

Elke operatie geeft kans op complicaties. Na het verkleinen van de neusschelpen bestaat bijvoorbeeld een kleine kans (1 %) op het ontstaan van een ernstige nabloeding.

Tot slot

Uiteraard is de medische situatie voor elke patiënt verschillend. Het kan daarom zijn dat om bepaalde redenen wordt afgeweken van het hierboven beschrevene.

Vragen

Als u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen heeft, aarzelt u dan niet de NKO-arts om nadere uitleg te vragen.